

2.3 Pacientes con enfermedad leve – moderado

2.3.1 Triage

Pregunta 4: En personas con sospecha o diagnóstico de COVID-19, ¿cuál es la estrategia de triaje que debe utilizarse?

Pregunta PICO abordada en esta pregunta clínica:

La presente pregunta clínica abordó la siguiente pregunta PICO:

Pregunta PICO N°	Paciente / Problema	Intervención/Comparación	Desenlaces
4	Personas con sospecha o diagnóstico de COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> Estrategia de triaje 	<ul style="list-style-type: none"> Mortalidad Necesidad de ventilación mecánica Resolución de los síntomas

Recomendaciones y contextualización:

Para esta pregunta, se decidió emitir un punto de buena práctica clínica basado en el “Reporte de evidencia para la evaluación y seguimiento remoto durante la pandemia de SARS-CoV2 (COVID-19)”, elaborado por el IETSI(20). Además, estas recomendaciones estuvieron acorde con lo referido por las “Directrices para la profilaxis y el manejo de pacientes con COVID-19 leve y moderada en América Latina y el Caribe” elaborado por la Organización Panamericana de la Salud(21).

Puntos de BPC:

Se consideró relevante emitir el siguiente punto de BPC al respecto de la pregunta clínica desarrollada:

Justificación	Punto de BPC
<p>Se consideró importante que se establezca un sistema de selección y clasificación de los pacientes que acuden a los centros de salud, de modo que se pueda racionalizar el uso de recursos y establezcan criterios que permitan tomar decisiones complejas y lograr un mejor resultado.</p> <p>Esto se podría realizar mediante la implementación de protocolos institucionales. Para esto, se consideró adaptar lo mencionado por el documento “Reporte de evidencia para la evaluación y seguimiento remoto durante la pandemia de SARS-CoV2 (COVID-19)”(20) en el que se establece un triaje o seguimiento remoto de casos sintomáticos respiratorios compatibles con COVID-19 para una clasificación adecuada.</p>	<p>Para realizar una clasificación adecuada de los pacientes con sospecha diagnóstica o confirmados por COVID-19, se deben implementar protocolos institucionales para el triaje.</p>